

**สรุปผลการสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ¹
และการบาดเจ็บที่สำคัญ ในประชากรอายุ 15-74 ปี
(เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550)**

| ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ¹ และการบาดเจ็บที่สำคัญ | | พ.ศ. 2548 | พ.ศ. 2550 |
|---|---|--------------|--------------|
| ส่วนที่ 1 | สุขภาพโดยทั่วไป | | |
| | ความชุกของผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม | 59.0 | 64.7 |
| | ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา | 1.4 | 1.2 |
| | ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา | 1.1 | 0.8 |
| ส่วนที่ 2 | การเข้าถึงบริการสุขภาพ | | |
| | ความชุกของผู้ที่ทราบว่าตนเองมีการประกันสุขภาพ | 97.6 | 94.2 |
| | ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า | 75.6 | 72.0 |
| | ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม | 12.6 | 13.8 |
| | ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ | 8.6 | 8.6 |
| | ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ | 1.1 | 1.0 |
| | ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน | 6.0 | 6.0 |
| | ความชุกของผู้ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเจ็บป่วยโดยไม่สามารถเบิกเงินคืนได้ให้กับสถานบริการสุขภาพต่างๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 45.4 | 38.5 |
| | ความชุกของผู้ที่มีจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วย แต่ไม่สามารถไปพบได้ เพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 7.8 | 6.5 |
| | ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาการเจ็บป่วยไม่รวมกรณีฉุกเฉิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง) | 1.7 | 1.7 |
| | ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ครั้ง) | 0.2 | 0.2 |

| ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ¹ และการบาดเจ็บที่สำคัญ | | พ.ศ. 2548 | พ.ศ. 2550 |
|---|---|--------------|--------------|
| | ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการรับประทานยาแก้ปวดลดได้ เช่น พาราเซตามอล แอสไพริน หรือยาประเภทบูรพาfen ใน 30 วัน ที่ผ่านมา | 3.6 | 3.5 |
| | ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการรับประทานยานอนหลับหรือยาคลายเครียดช่วยให้หลับเช่น ไทดอะซีแป้ม โลราซีแป้ม ใน 30 วันที่ผ่านมา | 0.5 | 0.5 |
| | ความชุกของการไปพบทันตแพทย์หรือทันตากิบາลเพื่อรักษาฟัน และเหงือกใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 22.8 | 22.1 |
| ส่วนที่ 3 | ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน | | |
| | ความชุกของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน(ดัชนีมวลกาย $\geq 25 \text{ กก./ม.}^2$) | 16.1 | 19.1 |
| | ความชุกของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย $\geq 30 \text{ กก./ม.}^2$) | 3.0 | 3.7 |
| | ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (นิ้ว) ในประชากรชาย | 31.8 | 31.9 |
| | ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (นิ้ว) ในประชากรหญิง | 30.2 | 30.6 |
| ส่วนที่ 4 | การรับประทานผัก ผลไม้ | | |
| | ความชุกของผู้ที่รับประทานผักหรือผลไม้รวมกัน 5 หน่วย มาตรฐานขึ้นไปต่อวัน | 17.3 | 22.5 |
| | ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการรับประทานผลไม้ ประเภทต่างๆ | 2.5 | 1.9 |
| ส่วนที่ 5 | ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการรับประทานผัก ประเภทต่างๆ | 2.7 | 2.5 |
| | กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย | | |
| | ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ (หมายถึง ผู้ที่มีการใช้แรงงานอย่างหนัก หรือผู้ที่มีการทำงานใช้แรงงานกลาง หรือทำงานแบบไม่ออกแรง แต่มีการออกกำลังกายอย่างน้อย ครั้งละ 3 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์) | 91.5 | 92.5 |
| | ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง และอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ | 30.9 | 37.5 |
| ส่วนที่ 6 | การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | | |
| | ความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน | 37.4 | 36.1 |
| | ความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างหนัก ใน 12 เดือน ที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน) | 3.6 | 3.6 |

| ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ¹ และการบาดเจ็บที่สำคัญ | | พ.ศ. 2548 | พ.ศ. 2550 |
|---|---|--------------|--------------|
| | ความชุกของผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอ올์ครั้งละ 5 แก้ว มาตรฐานขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา | 14.0 | 13.7 |
| ส่วนที่ 7 | การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ ความชุกของผู้ที่สูบบุหรี่หรือยาสูบในปัจจุบัน | 22.3 | 21.5 |
| | ค่าเฉลี่ยอายุที่เริ่มสูบบุหรี่จนหมัดมวนเป็นครั้งแรก | 17.9 | 17.9 |
| | ความชุกของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วันเพราวยา geleik สูบบุหรี่ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 55.3 | 52.6 |
| | ความดันโลหิตสูง ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 40-74 ปี | 77.3 | 78.1 |
| ส่วนที่ 8 | ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี | 8.3 | 9.4 |
| | ความชุกของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี | 52.8 | 50.8 |
| | จำนวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ไปพบแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการรักษา ใน 1 ปี ที่ผ่านมา | 6.5 | 6.8 |
| | โรคเบาหวาน ความชุกของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหา โรคเบาหวานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 40 -74 ปี | 49.6 | 55.6 |
| ส่วนที่ 9 | ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าเป็นโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15-74 ปี | 3.7 | 3.9 |
| | ความชุกของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้รับการตรวจเลือดหาระดับ น้ำตาลทุกเดือน | 57.0 | 46.8 |
| | จำนวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรอายุ 15-74 ปี ที่เป็นโรคเบาหวานไป พบแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาใน 1 ปีที่ผ่านมา | 8.0 | 8.1 |
| | โรคเรื้อรัง ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต | 0.9 | 1.1 |
| ส่วนที่ 10 | | | |

| ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ¹ และการบาดเจ็บที่สำคัญ | | พ.ศ. 2548 | พ.ศ. 2550 |
|---|--|--------------|--------------|
| | ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด | 1.1 | 1.5 |
| | ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ² ถุงลมโป่งพอง | 1.1 | 0.8 |
| | ความชุกของผู้ที่มีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตรายเรื้อรัง | 0.4 | 0.7 |
| | ความชุกของผู้ที่มีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดในปัจจุบัน | 1.6 | 1.4 |
| ส่วนที่ 11 | สุขภาพสตรี | | |
| | ความชุกของประชากรหญิงอายุ 35-74 ปี ผู้ที่ได้รับการตรวจ ³ ภายในเพื่อหาระดับปากมดลูกภายใน 3 ปี | 43.7 | 52.7 |
| ส่วนที่ 12 | โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี | | |
| | ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่เคยได้รับการตรวจเลือด ⁴ เพื่อหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่นับรวมกรณีบริจาคเลือด | 25.2 | 24.6 |
| ส่วนที่ 13 | ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่เคยได้รับการตรวจเลือด ⁴ เพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา | 10.6 | 10.3 |
| | การบาดเจ็บ | | |
| | ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบ ⁵ ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 52.4 | 54.0 |
| | ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบ ⁵ ทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 27.3 | 30.9 |
| | ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบ ⁵ ทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 67.0 | 68.3 |
| | ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบ ⁵ ทุกครั้งเมื่อโดยสารรถชนิดต่อนหน้าใน 12 เดือนที่ผ่านมา | 50.1 | 51.2 |
| | ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่ม ⁶ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน ที่ผ่านมา ⁷ ในประชากรที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อายุ 15-74 ปี | 15.7 | 15.5 |
| | ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับรถชนิดต่อนหน้าดื่มเครื่องดื่มที่มี ⁶ แอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรที่ ⁷ ขับรถชนิดต่ออายุ 15-74 ปี | 8.5 | 10.1 |